

DIARSANYL PV+

DIARSANYL PV+
Ceva Santé Animale

16

NAME

DIARSANYL PV® + (kein Tierarzneimittel)

Paste zum Eingeben
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Fohlen und Kälber

ZUSAMMENSETZUNG

Fructo-Oligosaccharide
Dextrose
Glycerol
Natriumchlorid
Magnesiumsalze organischer Säuren

Zusatzstoffe

Bentonit - Montmorillonit (E558) 40%
Kaliumsorbit

Analytische Bestandteile

Rohasche: 35%
Gesamtzuckeranteil: 30%
Feuchtigkeit: 22%
Chloride: 2,5%
Natrium: 2,5%
Kalium: 0,6%
Rohprotein: 0%
Rohfaser : 0 %
Rohöl und -fette: 0%

HANDELSFORMEN

60 ml-Dosierspritze für Fohlen und Kälber von 30 bis 60 kg

Zieltierart

Fohlen und Kälber

ANWENDUNGSHINWEISE

Stellen Sie den Dosierring vor der ersten Anwendung auf den entsprechenden Teilstrich ein (Dosierung s. unten). Führen Sie die Injektorspitze seitlich in das Maul des Tieres ein. Drücken Sie den Injektorkolben bis zum Anschlag.
Für die weiteren Anwendungen verfahren Sie wie unten beschrieben.

ANWENDUNG

Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Das Produkt hat keinen Einfluß auf die üblicherweise während Verdauungsstörungen empfohlenen Tagesrationen.


EMPFOHLENE ANWENDUNGSDAUER

Je einen Teilstrich morgens und abends pro 30-60 kg Körpergewicht, entsprechend zweimal täglich 10 ml.

Orale Eingabe über 3 Tage.

1 Teilstrich = 10 ml DIARSANYL PV +

Handelsformen	Tiergewicht	Dosierung	
		morgens	abends
Diarsanyl PV + 60 ml	30 - 60 kg	1 Teilstrich	1 Teilstrich



1 Teilstrich = 10 ml DIARSANYL PV +

Lagerung

Bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Vertrieb:

BE: Ceva Santé Animale - Av. de la Métrologielaan 6 - 1130 Brüssel -Belgien

Genehmigungsdatum der packungsbeilage

15.06.2012

FÜR TIERE